

Periodo de observaciones del 20 al 26 de MARZO de 2014

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
ALCARACEJOS	LA CHORRILLA	PICUAL	B	TRATAR	2
POZOBLANCO	LA MAÑA	PICUAL	BC	TRATAR	2
POZ.-AÑORA	LA ALISEDA	PICUAL	B	TRATAR	1
POZOBLANCO	LOS CHIVATILES	PICUAL	BC	TRATAR	2
ALCARACEJOS	PEÑÓN LAZARILLO	PICUAL	B	TRATAR	2
POZOBLANCO	LOS CHISPAS	PICUAL	BC	TRATAR	2
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	BC	TRATAR	2
POZOBLANCO	CERRO OBEJUELAS	PICUAL	B	TRATAR	2
POZOBLANCO	EL MAHAGO	PICUAL	AB	TRATAR	2
POZOBLANCO	VALLE IZQUIERDO	PICUAL	BC	TRATAR	2

**NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE:** 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.

**ESTADOS FENOLOGICOS:** A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto caujado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

**AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS**

(plagas, enfermedades, malas hierbas)

• **AGENTE:** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:

EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Hay presencia de prais filófaga, que ataca brotes y hojas en algunas zonas de muestreo, siendo la incidencia de ataque alta en LA CHORRILLA, MAÑA, CHIVATILES, CHISPAS, BOLLO Y MAHAGO, se están ya observando larvas fuera de las hojas que atacan brotes, en este estado no se recomienda el tratamiento en ninguna zona, en caso de olivos jóvenes observar los niveles de ataque y tratar si fuera necesario.

• **AGENTE:** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:

EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

En las observaciones que se realizan en los parajes problemáticos, se observa que está aumentando la presencia de repilo en todas las zonas. Debido a las condiciones climáticas de humedad y de aumento de temperaturas que favorecen el desarrollo de este hongo, se recomienda el tratamiento en todas las zonas con compuestos cúpricos, así como realizar podas que favorezcan la aireación.

\* **AGENTE:BARRENILLO** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:

EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda