

A.T.R.I.A.ECOLIPE II
INFORMACION FITOSANITARIA DEL OLIVAR

- **Periodo de observaciones de 24 al 30 de julio de 2.014**

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				MOSCA	
ALCARACEJOS	LA CHORRILLA	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LA MAÑA	PICUAL	H	2	
POZ.-AÑORA	LA ALISEDA	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LOS CHIVATILES	PICUAL	H	1	
ALCARACEJOS	PEÑÓN LAZARILLO	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LOS CHISPAS	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	CERRO OBEJUELAS	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	EL MAHAGO	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	VALLE IZQUIERDO	PICUAL	H	2	

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.

ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro

.Arc: ATOLIN

**AGENTES CON NIVELES
PROBLEMATICOS**
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- * **AGENTE: MOSCA ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:**
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

Aunque hay presencia de moscas en todas las estaciones y las aceitunas se encuentran receptivas para ser picadas, los valores de las moscas del olivo son muy bajos tanto en placa como en mosquero debido a las altas temperaturas, por lo que no se recomienda tratamiento en ninguna zona. En olivar convencional y ecológico deben de estar ya colocadas las trampas olipe con fosfato biamónico.

- * **AGENTE: BARRENILLO ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:**
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, para evitar la salida del barrenillo de los palos.