

**A. T. R. I. A. ECOLIPE II**  
**INFORMACION FITOSANITARIA DEL OLIVAR**

- Periodo de observaciones de 14 al 20 de agosto de 2.014

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				MOSCA	
ALCARACEJOS	LA CHORRILLA	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LA MAÑA	PICUAL	H	3	
POZ.-AÑORA	LA ALISEDA	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LOS CHIVATILES	PICUAL	H	1	
ALCARACEJOS	PEÑÓN LAZARILLO	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LOS CHISPAS	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	CERRO OBEJUELAS	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	EL MAHAGO	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	VALLE IZQUIERDO	PICUAL	H	1	

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: **0:** nulo; **1:** bajo - NO TRATAR; **2:** medio - NO TRATAR; **3:** alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; **'TRATAR':** se recomienda tratar.  
ESTADOS FENOLOGICOS: **A:** yema sin mover; **B:** yema movida; **C-D-E:** trama cerrada; **F:** trama abierta; **G:** fruto cuajado; **H:** endurecimiento del hueso; **I:** cambio de color en fruto; **J:** fruto maduro  
.Arc: ATOLIN

**AGENTES CON NIVELES  
PROBLEMATICOS**  
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- \* **AGENTE: MOSCA** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:  
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

En todas las zonas existe presencia de mosca, pero debido a las altas temperaturas que se están produciendo los valores tanto en mosquero como en placa son bajos. La aceituna esta receptiva para ser picada por la mosca, aunque se está empezando a arrugar en algunas estaciones, por lo cual no se recomienda tratamiento en ninguna zona. Prestar atención los socios que tengan olivar en la zona de la Maña, porque se están alcanzando el número de aceitunas picadas a partir del cual se recomienda el tratamiento de parcheo. En olivar convencional y ecológico deben de estar ya colocadas las trampas olipe con fosfato biamónico.

- \* **AGENTE: BARRENILLO** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:  
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, para evitar la salida del barrenillo de los palos.