

**A.T.R.I.A.ECOLIPE II**  
**INFORMACION FITOSANITARIA DEL OLIVAR**

- Periodo de observaciones de 21 al 27 de agosto de 2.014

| TERMINO MUNICIPAL | SUBZONA         | VARIEDAD | ESTADO FENOL. | AGENTES |  |
|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------|--|
|                   |                 |          |               | MOSCA   |  |
| ALCARACEJOS       | LA CHORRILLA    | PICUAL   | H             | 2       |  |
| POZOBLANCO        | LA MAÑA         | PICUAL   | H             | 3       |  |
| POZ.-AÑORA        | LA ALISEDA      | PICUAL   | H             | 1       |  |
| POZOBLANCO        | LOS CHIVATILES  | PICUAL   | H             | 2       |  |
| ALCARACEJOS       | PEÑÓN LAZARILLO | PICUAL   | H             | 1       |  |
| POZOBLANCO        | LOS CHISPAS     | PICUAL   | H             | 1       |  |
| POZOBLANCO        | EL BOLLO        | PICUAL   | H             | 1       |  |
| POZOBLANCO        | CERRO OBEJUELAS | PICUAL   | H             | 1       |  |
| POZOBLANCO        | EL MAHAGO       | PICUAL   | H             | 2       |  |
| POZOBLANCO        | VALLE IZQUIERDO | PICUAL   | H             | 1       |  |

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.

ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro

.Arc: ATOLIN

**AGENTES CON NIVELES  
PROBLEMATICOS**  
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- \* **AGENTE: MOSCA** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:  
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

En todas las zonas existe presencia de mosca, pero debido a las altas temperaturas que se están produciendo, los valores tanto en mosquero como en placa son bajos. La aceituna esta receptiva para ser picada por la mosca, aunque se está empezando a arrugar en algunas estaciones, por lo cual no se recomienda tratamiento en ninguna zona. Prestar atención los socios que tengan olivar en la zona de la Maña porque se están alcanzando el número de aceitunas picadas a partir del cual se recomienda el tratamiento de parcheo. En olivar convencional y ecológico deben de estar ya colocadas las trampas olipe con fosfato biamónico.

- \* **AGENTE: BARRENILLO** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:  
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, para evitar la salida del barrenillo de los palos.