

A. T. R. I. A. ECOLIPE II
INFORMACION FITOSANITARIA DEL OLIVAR

- Periodo de observaciones desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2.014

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				MOSCA	
ALCARACEJOS	LA CHORRILLA	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	LA MAÑA	PICUAL	H	TRATAR	
POZ.-AÑORA	LA ALISEDA	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LOS CHIVATILES	PICUAL	H	2	
ALCARACEJOS	PEÑÓN LAZARILLO	PICUAL	H	3	
POZOBLANCO	LOS CHISPAS	PICUAL	H	3	
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	CERRO OBEJUELAS	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	EL MAHAGO	PICUAL	H	3	
POZOBLANCO	VALLE IZQUIERDO	PICUAL	H	3	

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.
ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro
.Arc: ATOLIN

**AGENTES CON NIVELES
PROBLEMATICOS**
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- * **AGENTE: MOSCA** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

En todas las zonas existe presencia de mosca, pero debido a las altas temperaturas que se están produciendo, los valores tanto en mosquero como en placa van ascendiendo lentamente. La aceituna esta receptiva para ser picada por la mosca, aunque se está empezando a arrugar en algunas estaciones, siendo la zona de La Maña la única que ya se recomienda el tratamiento de parcheo, debido a que se han sobrepasado los valores de muestreo que nos indican que sea necesaria la aplicación. En olivar convencional y ecológico deben de estar ya colocadas las trampas olipe con fosfato biamónico.

- * **AGENTE: BARRENILLO** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, para evitar la salida del barrenillo de los palos.