

A. T. R. I. A. ECOLIPE II
INFORMACION FITOSANITARIA DEL OLIVAR

- Periodo de observaciones de 11 al 17 de septiembre de 2.014

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				MOSCA	
ALCARACEJOS	LA CHORRILLA	PICUAL	H	TRATAR	
POZOBLANCO	LA MAÑA	PICUAL	H	TRATAR	
POZ.-AÑORA	LA ALISEDA	PICUAL	H	TRATAR	
POZOBLANCO	LOS CHIVATILES	PICUAL	H	TRATAR	
ALCARACEJOS	PEÑÓN LAZARILLO	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	LOS CHISPAS	PICUAL	H	TRATAR	
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	H	TRATAR	
POZOBLANCO	CERRO OBEJUELAS	PICUAL	H	2	
POZOBLANCO	EL MAHAGO	PICUAL	H	1	
POZOBLANCO	VALLE IZQUIERDO	PICUAL	H	TRATAR	

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: **0**: nulo; **1**: bajo - NO TRATAR; **2**: medio - NO TRATAR; **3**: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; **‘TRATAR’**: se recomienda tratar.

ESTADOS FENOLOGICOS: **A**: yema sin mover; **B**: yema movida; **C-D-E**: trama cerrada; **F**: trama abierta; **G**: fruto cuajado; **H**: endurecimiento del hueso; **I**: cambio de color en fruto; **J**: fruto maduro

.Arc: ATOLIN

**AGENTES CON NIVELES
PROBLEMATICOS**

(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- * **AGENTE: MOSCA** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

En todas las zonas existe presencia de mosca y cada semana que pasa se incrementan más los valores de capturas en las trampas, esto es debido a que tras la bajada de temperaturas comienzan a incrementar su actividad, para en breve realizar las puestas de los huevos en las aceitunas, por lo que se recomienda tratamiento en la mayoría de las zonas. En olivar convencional y ecológico deben de estar ya colocadas las trampas olipe con fosfato biamónico.

- * **AGENTE: BARRENILLO** ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, para evitar la salida del barrenillo de los palos.