

Periodo de observaciones del 2 al 8 de ABRIL de 2.015

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
POZOBLANCO	ERA DE LAS HORMIGAS	PICUAL	C	TRATAR	1
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	C	TRATAR	1
ALCARACEJOS	LA MAÑA	PICUAL	C	TRATAR	1
ALCARACEJOS	GUADALBARBO	PICUAL	BC	TRATAR	1
POZOBLANCO	MOLINA SAN FERNANDO	PICUAL	C	TRATAR	1
ALCARACEJOS	CALATRAVEÑO	PICUAL	BC	TRATAR	1

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.

ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE:** **PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Hay presencia de prais filófaga y antófaga en todas las estaciones. La generación filófaga está terminando su ciclo debido a que las larvas están haciendo las pupas de las cuales saldrán las mariposas de la generación antófaga (comen racimos florales), por otro lado hay unas pocas capturas de adultos de prays en los polilleros, lo que nos indica la inminente puesta de huevos de las polillas en los racimos florales.

- **AGENTE:** **REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Debido a las condiciones climáticas de humedad y temperatura se está observando el incremento de la presencia de repilo en todas las zonas, se recomienda el tratamiento en todas las zonas con compuestos cúpricos o sistémicos, así como realizar podas que favorezcan la aireación.

- * **AGENTE:BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda