

**Periodo de observaciones del 26 de MARZO al 1 de ABRIL de 2.015**

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
POZOBLANCO	ERA DE LAS HORMIGAS	PICUAL	BC	TRATAR	1
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	BC	TRATAR	2
ALCARACEJOS	LA MAÑA	PICUAL	BC	TRATAR	1
ALCARACEJOS	GUADALBARBO	PICUAL	B	TRATAR	1
POZOBLANCO	MOLINA SAN FERNANDO	PICUAL	BC	TRATAR	3
ALCARACEJOS	CALATRAVEÑO	PICUAL	B	TRATAR	3

**NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE:** 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.  
**ESTADOS FENOLOGICOS:** A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

**AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS**  
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE: PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*  
Hay presencia de prais filófaga, que ataca brotes y hojas en las zonas de muestreo, siendo la incidencia de ataque moderada, pero se está empezando a reducir el número de larvas debido a que están haciendo la pupa, de la que saldrá la generación antófaga (se alimenta de la flor).
- **AGENTE: REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*  
En las observaciones que se realizan en los parajes problemáticos, se observa que está aumentando la presencia de repilo en todas las zonas. Debido a las condiciones climáticas de humedad y de aumento de temperaturas que favorecen el desarrollo de este hongo, se recomienda el tratamiento en todas las zonas con compuestos cúpricos, así como realizar podas que favorezcan la aireación.
- \* **AGENTE: BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*  
La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda