

**Periodo de observaciones del 4 al 10 JUNIO de 2.015**

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
POZOBLANCO	ERA DE LAS HORMIGAS	PICUAL	G	TRATAR	1
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	G	TRATAR	2
ALCARACEJOS	LA MAÑA	PICUAL	G	TRATAR	2
ALCARACEJOS	GUADALBARBO	PICUAL	G	TRATAR	1
POZOBLANCO	MOLINA SAN FERNANDO	PICUAL	G	TRATAR	1
ALCARACEJOS	CALATRAVEÑO	PICUAL	G	TRATAR	2

**NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE:** 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; 'TRATAR': se recomienda tratar.

**ESTADOS FENOLOGICOS:** A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

**AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS**

(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE:** **PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

Las capturas de adultos de prais en los polilleros se han reducido de forma considerable, ya que se han realizado la mayoría de las puestas en las aceitunas. Se esta comenzando a observar en las aceitunas con tamaño de guisante penetraciones de las larvas de prais hacia la parte interior del futuro hueso. En producción integrada está autorizado el uso de materias activas como BACILLUS THURIGIENSIS, DIMETOATO, DELTAMETRIN, PIRETROIDES cuando se supera el umbral de tratamiento.

- **AGENTE:** **REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

Se está produciendo la caída de hoja debido al repilo en todas las zonas, aunque no debe confundirse con la caída de hoja vieja del olivo. En las zonas en las que se encuentre la aceituna con un tamaño de guisante podemos realizar tratamientos foliares.

- **AGENTE:** **COCHINILLA DE LA TIZNE** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

La cochinilla excreta abundante melaza que impregna las hojas, desarrollándose sobre la misma la negrilla que es un conjunto de hongos que le da un aspecto negruzco a las hojas. Solo Se ha observado unos individuos en el paraje de la Fábrica el Chato.

- \* **AGENTE:** **BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando salidas de barrenillo en leñas procedente de la poda.