

Periodo de observaciones del 16 al 22 de ABRIL de 2.015

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
POZOBLANCO	ERA DE LAS HORMIGAS	PICUAL	D2	TRATAR	3
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	D2	TRATAR	3
ALCARACEJOS	LA MAÑA	PICUAL	D2	TRATAR	3
ALCARACEJOS	GUADALBARBO	PICUAL	D1	TRATAR	2
POZOBLANCO	MOLINA SAN FERNANDO	PICUAL	D2	TRATAR	3
ALCARACEJOS	CALATRAVEÑO	PICUAL	D1	TRATAR	2

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: **0:** nulo; **1:** bajo - NO TRATAR; **2:** medio - NO TRATAR; **3:** alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; '**TRATAR**': se recomienda tratar.
ESTADOS FENOLOGICOS: **A:** yema sin mover; **B:** yema movida; **C-D-E:** trama cerrada; **F:** trama abierta; **G:** fruto cuajado; **H:** endurecimiento del hueso; **I:** cambio de color en fruto; **J:** fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE: PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Hay presencia de prais antófaga (comen racimos florales) en todas las estaciones, en los muestreos se va observando un incremento considerable en el número de capturas en el polillero debido a que están saliendo las polillas que se han generado de las larvas de la generación filófaga (come hojas). La generación antófaga es la que hay que controlar para evitar la puesta de los huevos en las aceitunas, en producción integrada está autorizado el uso de materias activas como BACILLUS THURIGIENSIS, DIMETOATO, DELTAMETRIN, PIRETROIDES cuando se supera el umbral de tratamiento.

- **AGENTE: REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Debido a las condiciones climáticas de humedad y temperatura se está observando el incremento de la presencia de repilo en todas las zonas, se recomienda el tratamiento en todas las zonas con compuestos cúpricos o sistémicos, así como realizar limpieza de las cabezas de los olivos.

- * **AGENTE: BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda