

**Periodo de observaciones del 21 al 27 de MAYO de 2.015**

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
POZOBLANCO	ERA DE LAS HORMIGAS	PICUAL	G	TRATAR	1
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	F-G	TRATAR	2
ALCARACEJOS	LA MAÑA	PICUAL	F-G	TRATAR	1
ALCARACEJOS	GUADALBARBO	PICUAL	F-G	TRATAR	1
POZOBLANCO	MOLINA SAN FERNANDO	PICUAL	F-G	TRATAR	2
ALCARACEJOS	CALATRAVEÑO	PICUAL	F-G	TRATAR	1

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: **0:** nulo; **1:** bajo - NO TRATAR; **2:** medio - NO TRATAR; **3:** alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; '**TRATAR**': se recomienda tratar.  
ESTADOS FENOLOGICOS: **A:** yema sin mover; **B:** yema movida; **C-D-E:** trama cerrada; **F:** trama abierta; **G:** fruto cuajado; **H:** endurecimiento del hueso; **I:** cambio de color en fruto; **J:** fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

**AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS**  
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE: PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

Las capturas de adultos de prais en los polilleros se han mantenido respecto a la semana anterior, siendo los valores en general bajos, ya que se han realizado la mayoría de las puestas en las flores. En estos momentos se pueden observar con lupa las puestas de los adultos en los olivares que están con las aceitunas cuajadas. En producción integrada está autorizado el uso de materias activas como BACILLUS THURIGIENSIS, DIMETOATO, DELTAMETRIN, PIRETROIDES cuando se supera el umbral de tratamiento.

- **AGENTE: REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

Se está produciendo la caída de hoja debido al repilo en todas las zonas, siendo la zona más afectada la del Guadalbarbo, aunque no debe confundirse con la caída de hoja vieja del olivo. En estos momentos no se recomiendan tratamientos foliares en los olivares en los que se ha producido la apertura de la mayoría de las flores.

- \* **AGENTE: BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*  
*EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:*

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda