

Periodo de observaciones del 23 al 29 de ABRIL de 2.015

| TERMINO MUNICIPAL | SUBZONA | VARIEDAD | ESTADO FENOL. | AGENTES | |
|-------------------|---------------------|----------|---------------|---------|---------|
| | | | | REPILO | PRAIS . |
| POZOBLANCO | ERA DE LAS HORMIGAS | PICUAL | DII | TRATAR | 2 |
| POZOBLANCO | EL BOLLO | PICUAL | DII | TRATAR | 3 |
| ALCARACEJOS | LA MAÑA | PICUAL | DII | TRATAR | 2 |
| ALCARACEJOS | GUADALBARBO | PICUAL | DII | TRATAR | 1 |
| POZOBLANCO | MOLINA SAN FERNANDO | PICUAL | DII | TRATAR | 3 |
| ALCARACEJOS | CALATRAVEÑO | PICUAL | DII | TRATAR | 2 |

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; **'TRATAR'**: se recomienda tratar.

ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS

(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE:** **PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Hay presencia de polillas de prais antófaga en todas las estaciones, en estos momentos se están produciendo las puestas en los racimos florales de los cuales se alimentarán las larvas. La generación antófaga es la que hay que controlar para evitar que se desarrollen las larvas y den como consecuencia un gran número de adultos que realicen las puestas de los huevos en las aceitunas recién cuajadas. En producción integrada está autorizado el uso de materias activas como BACILLUS THURIGIENSIS, DIMETOATO, DELTAMETRIN, PIRETROIDES cuando se supera el umbral de tratamiento.

- **AGENTE:** **REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Debido a las condiciones climáticas de humedad y temperatura se está observando el incremento de la presencia de repilo en todas las zonas, se recomienda el tratamiento en todas ellas con compuestos cúpricos o sistémicos, así como realizar limpieza de las cabezas de los olivos.

- * **AGENTE:BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda