

Periodo de observaciones del 19 al 25 de MAYO de 2.016

TERMINO MUNICIPAL	SUBZONA	VARIEDAD	ESTADO FENOL.	AGENTES	
				REPILO	PRAIS .
POZOBLANCO	ERA DE LAS HORMIGAS	PICUAL	D-F	TRATAR	2
POZOBLANCO	EL BOLLO	PICUAL	D-F	TRATAR	2
ALCARACEJOS	LA MAÑA	PICUAL	D-F	TRATAR	1
ALCARACEJOS	GUADALBARBO	PICUAL	D	TRATAR	1
POZOBLANCO	MOLINA SAN FERNANDO	PICUAL	D-F	TRATAR	1
ALCARACEJOS	CALATRAVEÑO	PICUAL	D	TRATAR	1

NIVELES DE ATAQUE DEL AGENTE: 0: nulo; 1: bajo - NO TRATAR; 2: medio - NO TRATAR; 3: alto - ALERTA PARA TRATAMIENTO - consultar al técnico; **'TRATAR'**: se recomienda tratar.
ESTADOS FENOLOGICOS: A: yema sin mover; B: yema movida; C-D-E: trama cerrada; F: trama abierta; G: fruto cuajado; H: endurecimiento del hueso; I: cambio de color en fruto; J: fruto maduro .Arc: FichaHOJA INFORMATIVA

AGENTES CON NIVELES PROBLEMATICOS
(plagas, enfermedades, malas hierbas)

- **AGENTE:** **PRAIS** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Las capturas de adultos de prais en los polilleros están descendiendo, lo que nos indica que ya se han producido la mayoría de las puestas en las flores. En estos momentos se pueden observar en los olivos las sedas producidas por los gusanos en las inflorescencias (racimos de flores), aunque el número de larvas es pequeño. No se recomienda tratamiento.

- **AGENTE:** **REPILO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

Se está produciendo la caída de hoja debido al repilo en todas las zonas debido a las temperaturas suaves y a la alta humedad. Se recomienda el tratamiento en aquellas zonas en las cuales no se haya producido la apertura de más del 5 % de las flores.

- * **AGENTE:** **BARRENILLO** *ESTADO AGENTE / FASE ATAQUE:*
EVOLUCION DEL AGENTE Y RECOMENDACIÓN:

La leña debe estar recogida y tapada, ya que se están observando entradas de barrenillo en leñas procedente de la poda